Вакцинация от гепатита В

Первое введение вакцины против гепатита В важно проводить новорожденным в течение первых 24 часов жизни (при согласии родителей).

Зачем?

- Гепатит В — опасное для жизни инфекционное заболевание печени.
- Грудничок чаще всего заражается от мамы.
- Тесты, которые проходит женщина во время беременности, не могут на 100 % показать отсутствие вируса в ее организме.

Можно привить ребенка в 1 месяц?

Главная причина раннего введения вакцин детям – максимально быстро защитить их от серьезного заболевания.



Куда?

Новорожденным вакцина вводится внутримышечно, в передне-боковую поверхность бедра.



Малыш точно не заболеет?



- В результате прививки - нет.
- В результате вакцинации у ребенка выработаются антитела, которые будут защищать его от вируса.

А будет ли желтуха?

Нет. Вакцинация от гепатита В не является причиной желтухи у новорожденного.

Современной

рекомбинантной вакцине от гепатита В более 30 лет, она досконально изучена. Для малыша вакцина эффективна и безопасна.

Реакция на вакцинацию

Могут наблюдаться местные симптомы в месте введения вакцины (покраснение, отек, уплотнение) и общие - это повышение температуры тела не более 37.5 (без ухудшения состояния) .



Здесь рождается счастье
МРПЦ г.Октябрьский

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. №252н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»