# Вакцинация от туберкулеза

БЦЖ - вакцина от туберкулеза



Возбудитель туберкулеза - бактерия Mycobacterium tuberculosis, чаще всего поражающая легкие. Туберкулез излечим и предотвратим.

## Как малыш может заразиться туберкулезом?

Основной источник микобактерий для новорожденного - это его окружение. Важно обследовать членов семьи ребенка на туберкулез.
В перинатальном центре Вам предложат пройти флюорографию (рентген легких) перед выпиской.

## Когда прививать малыша?

- Вакцинация новорожденных против туберкулеза может проводиться на 3-7 сутки жизни.
- Выписка возможна после вакцинации в тот же день при отсутствии реакции на нее (в течении 2 часов после вакцинации)

## Зачем прививать новорожденного?

Туберкулез в возрасте до года очень опасен. Младенцы подвержены риску развития тяжелых форм туберкулеза.

## Реакция на вакцинацию

Местные: Крайне редко в месте введения вакцины развивается холодовой абсцесс
Общие: Гипертермия без ухудшения состояния ребенка.

## После прививки малыш не заболеет?

Вакцинация от туберкулеза значительно снижает (на 90 %) частоту тяжелых форм туберкулеза среди вакцинированных в неонатальный период. Но БЦЖ не снижает шансы заразиться и заболеть туберкулезом.

## На месте вкола прыщик, это нормально?

После вакцинации на месте вкола образуется папула, через 15-20 минут она исчезает. Через 4-6 недель после вакцинации в месте инъекции у ребенка появятся поствакцинальные изменения, а к году формируется рубец. Место реакции категорически запрещается обрабатывать любыми растворами и смазывать мазями.

**В России туберкулез не редкость, поэтому новорожденные особенно нуждаются в защите.**

## Можно мочить руку?

Можно, но место реакции не нужно тереть мочалкой.

**Здесь рождается счастье**
МРПЦ г.Октябрьский

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. №252н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»